

取扱説明書

ソルボDo オスグッド・シュラッターバンド

膝下部圧迫固定バンド


＜オスグッド・シュラッター病の膝の負担を軽減＞

成長期に多い脛骨と膝蓋靭帯の接合部のトラブルに。
膝蓋靭帯を圧迫し、動きを抑えることで、膝下部のトラブルを軽減します。


オスグッド・シュラッター病

成長期（小学校高学年～高校）に起こる膝下の痛みは、成長痛（オスグッド・シュラッター病）といい、特にスポーツをする男子に多発します。脛骨（スネの骨）の成長する部分をスポーツなどで靭帯が繰り返し引っ張ることにより、脛骨と膝蓋靭帯部分の接合部に負担がかかり、炎症を起こして骨が損傷し、痛みが発生します。


＜成長期の膝のメカニズム＞



特長




- ①下部より膝蓋骨（お皿）を押さえるので、膝の揺れを少なくして安定させます。
- ②サポートバンドが膝の下部を均等に圧迫します。
- ③圧迫度も面ファスナーで調節自由自在。
- ④ベルト式で装着が簡単。使用中の違和感も少なく手軽に膝トラブル対策ができます。
- ⑤衝撃吸収性、圧力分散性に優れた人工筋肉「ソルボセイン」を加圧パッドに使用し、長時間の使用も快適。



使用方法

☆トラブルが発生した場合は、すぐに専門医にご相談ください。

- 1.本品の上下、表裏を確認します。
- 2.バンドのベルトをDカンに通し引っ張りながら、膝下約5cmのくぼみで軟らかい部分にソルボ加圧パッドがあたるようにします。
- 3.右写真のようにベルトとサポートバンドを左右均等に締め付けソルボ加圧パッドがズレないようにしっかりと固定してください。この場合、踏み込んだ際に、少し圧迫感を感じる強さを目安としてください。




- * 痛みのある部位は避けて装着してください。
- * 締めすぎには十分注意してください。

使用上の注意

- 上下、表裏を確認して使用してください。
- 使用方法に従って、正しく使用してください。
- 最初はゆるめにして、あまり強くしめないでください。
- 装着時間は、1日2～3時間から始めて、徐々に増やしてください。
- 締めすぎには、十分注意してください。
- 就寝中は、使用しないでください。
- 本品の機能を損なわないために、正しく装着してご使用ください。
- 長時間の使用や使用状況によっては、破損する場合があります。破損した場合は、すみやかに使用を中止してください。
- ソルボセインを折り曲げたり、もみ洗いしないでください。破損の原因になります。
- ゴムなどのアレルギー疾患などお肌に異常がある場合は、使用しないでください。
- 痛み・発疹・かぶれ・うっ血・かゆみ・しびれ等の異常を感じた場合は、使用を中止し、専門医にご相談ください。そのまま使用を続けると、悪化する場合があります。
- 骨折、ねんざ、靭帯損傷など発生直後は使用しないで、すぐに専門医の診断を受けてください。
- 本品は治療用ではありません。効果については個人差があります。
- 使用目的以外には使用しないでください。

サイズの選び方

立位で、膝のお皿の中心より5cm下部を計測します。（計測値が重なるサイズの場合は、大きめのサイズをお選びください。）



サイズ（膝頭下部5cm）
M 26～33cm
L 33～40cm
 カラー：ブラック
 左右兼用

お手入れの方法

- お洗濯は中性洗剤を使用し、ぬるま湯で押し洗いしてください。洗剤を十分にすすぎ落としてから、絞らずにタオル等で軽く水気を取って、陰干ししてください。
- 乾燥機の使用はお避けください。
- 洗濯の際、色物と一緒に洗わないでください。色が染まる場合があります。

〔洗濯表示〕



#96578

